

**Od 1 marca 2019 w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej zostaje
wprowadzona nowa diagnostyka:**

- badanie Norowirus w kale w cenie 70 zł

Test Norowirus wykonywany w ZDL jest jakościowym testem immunologicznym do wykrywania norowirusów genogrupy I i II w ludzkich próbkach kału.

Norowirus jest drugim pod względem częstości występowania czynnikiem etiologicznym wirusowych biegunek u małych dzieci, natomiast u starszych dzieci i dorosłych jest jednak najczęstszym powodem zachorowań. Największa zachorowalność przypada w okresie zimowym

Norowirusy należące do rodziny kalciwirusów są grupą ponad 40 niezwykle heterogennych wirusów. Infekcja charakteryzuje się zazwyczaj samoograniczającymi się wymiotami i biegunką. Norowirusy zostały podzielone z powodu podobieństwa swojego genomu na pięć grup (GI-GV), jednakże ludzie mogą się zainfekować szczepami wirusów I i II. Mogą być przyczyną wirusowego zakażenia przewodu pokarmowego,

Serdecznie zapraszamy

od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰-11⁰⁰

I piętro Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

2010,
P. O. DYREKTORA
Szpitala Pomnikowego w Chęszynie
mgr Alicja Dobranowska